

Comment protéger mon chien des piqûres de tiques ?

Scalibor vous permet en un seul geste de protéger votre chien **6 mois** contre les piqûres de tiques, et limite donc les risques de transmission de la piroplasmose.

Dès la première semaine après la pose du collier, le principe actif de Scalibor se répand sur la peau de votre chien et **empêche les tiques de venir le piquer.**



IMPORTANT !

Les tiques sont présentes presque toute l'année. **2 colliers Scalibor par an suffisent** pour bien protéger votre chien !



2 colliers Scalibor suffisent



Durée d'efficacité du collier



c'est très très fort !

Composition : Collier Grand Chien : deltaméthrine 1 g, oxyde de titane (E 171) 0,375 g, excipient q.s.p. 25g ; Collier Petit Chien et Chien Moyen : deltaméthrine 0,76 g, oxyde de titane (E 171) 0,285 g, excipient q.s.p. 19 g. Indications : chez les chiens, affections à parasites sensibles à la deltaméthrine : prévention des infestations par les tiques pendant 6 mois, prévention des piqûres de phlébotomes pendant 5 mois, prévention des piqûres de moustiques (*Culex pipiens*) pendant 6 mois. Posologie, mode et voie d'administration : usage externe. Ajuster le collier sans le serrer au cou de l'animal et couper l'excédent de collier en laissant 5 cm après la boucle. Le collier doit être posé une semaine avant l'introduction du chien en milieu infesté. Contre-indications : en l'absence de données disponibles, ne pas utiliser chez les chiots de moins de 7 semaines. Précautions particulières d'emploi : il est déconseillé de poser le collier sur un animal présentant des lésions cutanées étendues. Précautions particulières en cas de gravidité ou de lactation : les études chez les animaux de laboratoire (rat, lapin) n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène de la deltaméthrine. L'innocuité de la spécialité chez la chienne pendant la gestation n'a pas été montrée. L'utilisation de la spécialité chez la femelle gravide est déconseillée. Le collier peut être porté par les chiennes en période de lactation. Surdosage : en cas d'ingestion accidentelle du collier par le chien, les symptômes suivants d'intoxication peuvent être observés : incoordination des mouvements, tremblements, hypersalivation. Ils sont réversibles sous 48 heures. L'antidote est le diazepam. Précautions particulières pour l'utilisateur : conserver hors de portée des enfants, ne pas laisser les enfants jouer avec le collier, se laver les mains à l'eau froide et au savon après manipulation du collier. Conservation : ne pas conserver à une température supérieure à 25°C. Présentations : boîte de 1 sachet de 1 collier Grand Chien, A.M.M. 675 937.0 du 05/03/1997 ; boîte de 1 sachet de 1 collier Petit Chien et Chien Moyen, A.M.M. 675 936.4 du 05/03/1997. Fabriqué par Intervet International B.V. - BOXMEER - Pays-Bas. Usage vétérinaire. Intervet S.A. - B.P.17144 - 49071 BEAUCOUZE CEDEX

Pour le protéger longtemps contre les tiques



* *Culex pipiens*



Scalibor

c'est très très fort !

com Ilundi - Ref. : 22334

Les tiques

un danger pour votre chien !

Les tiques sont présentes partout en France et presque toute l'année !

Où que vous vous trouviez, votre chien est susceptible d'attraper des tiques.

On les retrouve le plus souvent dans les milieux humides et les hautes herbes. Elles s'adaptent à presque toutes les températures, et peuvent piquer votre chien à n'importe quel moment de l'année.

Un parasite qui se nourrit du sang de votre chien



La tique est armée d'un rostre acéré avec lequel elle perce la peau de votre chien pour aspirer son sang. Une fois gorgée de sang, elle peut mesurer près d'un centimètre.

Solidement ancrée sur la peau de votre chien, la tique est toujours difficile à retirer.

Les tiques peuvent transmettre à votre chien des maladies graves

Lorsque la tique pique votre chien, elle peut lui transmettre des maladies graves. La plus fréquente est la piroplasmose qui se manifeste par une atteinte du foie et du rein. Les premiers symptômes sont une grande fatigue, une forte fièvre et une perte d'appétit. C'est une maladie qui peut être mortelle si elle n'est pas traitée.

Avez-vous pensé à protéger votre chien contre les tiques ?

Scalibor est particulièrement efficace pour **protéger** votre chien **contre les piqûres de tiques.**

Pour une efficacité optimale, **suivez bien nos conseils :**


1 Placez le collier autour du cou de votre chien, et fermez le en utilisant la boucle



2 Il doit être au contact de la peau mais pas trop serré, si vous pouvez passer juste deux doigts entre le collier et le cou de votre chien, le serrage est bon !



3 Coupez ensuite l'excédent de collier à 3-4 cm de la boucle.



4 C'est parti pour 6 mois de protection contre les tiques

Important !

 Scalibor est **sans odeur.**

Scalibor protège également votre chien contre les insectes vecteurs de la **leishmaniose** pendant 5 mois.