

communiqué de presse – 04/04/11

Protéger les chiens contre la leishmaniose : une nécessité en 2011.

Le danger de leishmaniose existe toujours : une nouvelle étude précise l'évolution de la maladie en France.

Certains insectes voisins du moustique peuvent transmettre aux chiens une maladie très grave : la leishmaniose. Cette maladie représente toujours un danger dans une vingtaine de départements français en 2011. Ce sont les conclusions d'une nouvelle étude réalisée par l'Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes (Oniris) et le laboratoire Intervet.

La zone à risque est majoritairement située sur les régions PACA, Languedoc-Roussillon et Corse. En comparaison des résultats obtenus en 2004, un début d'extension vers l'ouest est noté en région Midi-Pyrénées.

En l'absence de traitement curatif, la prévention est essentielle pour protéger les chiens contre cette maladie.

Dans une grande campagne de sensibilisation qui débutera en avril, le laboratoire Intervet encourage les propriétaires de chiens à protéger leur compagnon avec Scalibor. Ce collier antiparasitaire leur assure en un seul geste 5 mois de protection contre les insectes transmettant la leishmaniose.



Zone à risque

Nombre maximal de cas déclarés par clinique et par an :

-  0 à 10
-  11 à 20
-  Plus de 20

Etude ONIRIS - service DPM - Pr P. Bourdeau,
1108 vétérinaires, octobre 2010 à décembre 2010



Contact :
Stéphane LEGRAND
02.41.22.84.39
stephane.legrand@sp.intervet.com

Scalibor est un médicament vétérinaire.