

Mentions légales de BRAVECTO solution pour spot-on pour chats

Création 02.05.2016

Review : 18.07.2018

MàJ : Extension d'indication : *Otodectes* / 23.10.2019

MàJ : ajout de différents effets indésirables, suite à l'évaluation d'un PSUR 24.02.2020

MàJ : Effets Indésirables 21.10.2021

MàJ : 02062023 : Alignement des textes produit avec QRD9 / Changements dans les rubriques effets indésirables suite à la gestion des cas de PV

Màj : 06/08/2025 : Modification de la section des effets indésirables du RCP et de la notice sur la base des résultats des activités de pharmacovigilance en cours.

Bravecto® 112,5 mg solution pour spot-on pour chats de petite taille (1,2 – 2,8 kg).

Bravecto® 250 mg solution pour spot-on pour chats de taille moyenne (> 2,8 – 6,25 kg).

Bravecto® 500 mg solution pour spot-on pour chats de grande taille (> 6,25 – 12,5 kg).

Composition qualitative et quantitative : chaque mL contient 280 mg de fluralaner. Chaque applicateur délivre : pour chats de petite taille (1,2 – 2,8 kg) Fluralaner 112,5 mg ; pour chats de taille moyenne (> 2,8 – 6,25 kg) Fluralaner 250 mg ; pour chats de grande taille (> 6,25 – 12,5 kg) Fluralaner 500 mg. **Excipients :** Diméthylacétamide ; Glycofurol ; Diéthyltoluamide ; Acétone. Solution pour spot-on limpide, de couleur jaune à incolore. **Espèces cibles :** chats.

Indications d'utilisation pour chaque espèce cible : Traitement des infestations par les tiques et les puces chez les chats. Ce médicament vétérinaire est un insecticide et un acaricide systémique qui assure : - une activité immédiate et persistante sur les puces (*Ctenocephalides felis*) et sur les tiques (*Ixodes ricinus*) pendant 12 semaines. Afin d'être exposées à la substance active, les puces et les tiques doivent être présentes sur l'animal et avoir commencé à se nourrir. Le médicament vétérinaire peut être utilisé dans le cadre d'un plan de traitement de la dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP). Pour le traitement des infestations par la gale des oreilles (*Otodectes cynotis*). **Contre-indications :** Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients. **Effets indésirables :** chats : Fréquent (1 à 10 animaux / 100 animaux traités) : Réactions cutanées au niveau du site d'application (telles que Erythème, Prurit, Alopécie)[#]. Peu fréquent (1 à 10 animaux / 1 000 animaux traités) : Tremblements musculaires ; Léthargie ; Anorexie ; Vomissements ; Hypersalivation. Très rare (<1 animal / 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés) : Prurit ; Ataxie ; Convulsions. [#] légers et transitoires. Il est important de notifier les effets indésirables. La notification permet un suivi continu de l'innocuité d'un médicament vétérinaire. Les notifications doivent être envoyées, de préférence par l'intermédiaire d'un vétérinaire, soit au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, soit à l'autorité nationale compétente par l'intermédiaire du système national de notification. Voir également la rubrique « Coordonnées » de la notice pour les coordonnées respectives. **Temps d'attente :** sans objet. **À usage vétérinaire uniquement. Médicament vétérinaire soumis ordonnance.** Intervet, 49071 BEAUCOUZE CEDEX, France.